

**AcidDuo**

Puritabletti

**LÄÄKINTÄÄLLINEN LAITE CE0426****VÄHENTÄÄ MAHANSIÄLLÖN TAKAISINVIRTAUSTA LIEVITÄÄ LIKKAHAPPON****SUOJAA MAHALAUKUN LIKKAKALVOA****1. Valmis lääkeaine ja käyttötarkoitus****Acidduo** on tarkoitettu mahansiällön takaisinvirtaukseen, hapon aiheuttaman poltetellun ja näihin liittyvän raskaan olon lievitämiseen.**Acidduo** lievitää mahan liikkahappoisuutta ehkäisen näristyksen, vatsakipua ja hampamuuteen liittyviä ruopansulatuksivivoja.**Acidduo** tehoaks valmiste riippumattomat siitä, mistä vaivat johtuvat. Tätä valmistetta voi myös käyttää gastritistä (mahasiällöin) tulehduslukon, ns. mahakatarin) tulkituloina.**1.1 Vaikuttustapa****Acidduo** sisältää seoksen useita eri ainesosiota, jotka toimivat yhdessä mahalaukun hampamassa ympäristöön.

Alginaatti on polysakkari (kuittu), jota eristetään tiettytäppisistä merileivistä.

Kuittu eristää pääseet mahalaukun hampamasta ympäristöön, se mineraalit ja peptidi veden ja suolen geelin, joka peittää ja suojaa mahalaukun limakevoja. Valmisteen erityinen aineisto, joka sisältää sekä natriumalgaattia, alginihappoa että bikarbonaattia, nopeuttaa edelleä mainittua reaktiota entistään. Viskositi (eli saka, sitkeä) alginaatti eriläistää hillitsee mahalaukun ja mahansiällön ruokatorveen. Työntää liikkelyt ja vähentää siten takaisinvirtausten määrää. Karbonaatin ja bikarbonaatin yhdistelmä neutraloi mahahappoa. Reaktiossa muodostuvat hillidiosidikuplat jäävät alginaattigeelin sisälle, jolloin geeli muuttuu mahansiällön päälle kellumaan nousevaksi vaahdoksi.

**1.2 Koostumus**

Jokainen tabletti sisältää: 200 mg natriumalgaattia, 50 mg alginihappoa, 80 mg natriumbikarbonaattia ja 140 mg kaliumkarbonaattia.

**Apuaineet**

Mannitol, suoraulosi, piidioksiidi, kasvirapineeri magnesiumsteearaatti, glycerolilideehanetta, makuineet: inikiväriäriute, eteerinen inikiväriöljy, sitruuna, minttu.

**2. Pakkaus**

Yksi pakaus sisältää 24 tai 36 tablettia.

**3. Annostus ja antotapa**

Ennen valmisten mahdollista antoja lapselle, suositellaan keskuun ja lääkärin katsos. Varoiltuksit ja varotoimet, ks. tämä käytäväohje sivulla 7.

Alkuiski (12-vuotiaista alkaen): Suositussanos on 2 puritablettia jokaisen pääterian jälkeen.

Lapsek (6–12-vuotiaat): Suositussanos on 1 purutabletti jokaisen pääterian jälkeen.

Edella mainitut annokset lievittävät heikoasti liikkahappoisuutta ja estävät mahansiällön takaisinvirtausta ruokatorveen.

Suositeltu annosta ei saa ylittää.

**4. Havitointivaikeuden käsittely****Acidduo**-valmisteen sisältämät ainesosat on spefisesti testattu ja soottotu turvallisuksi, täysin bioyleentesopivaksi ja hyvin siedetyiksi.

Ohjeen mukaisella annostuksella ainoat raportoidut, mahdolliset ilmelevät havitointivaikeudet ovat ummetus ja ohuneva.

Jos olet käytävän, käänny lääkärin puoleen.

**5. Yhteisvaikutukset/ravintolaiset ja lääkkeiden kanssa****Acidduo**-valmisteen sisältämillä ainolla ei ole tunnustettu yhteisvaikutuksia ravintolaisissa kanssa. Yleissäätöntöön voidaan kuitenkin todeta, että kaikki ravintolaisit (kuten vitamiinit, ravintovalmisteet, yritti- tai homeopaatiset valmisteet) olisi ottettava viimeistään kaksi tuntia ennen, tai alkaisintaan kaksi tuntia jälkeen, **Acidduo**-annoksen.**5.1 Yhteisvaikutukset/lääkkeiden kanssa**

Viskoosi luonteesa vuoksi tämä lääkimallinen laite saatetaan viivästyttää tai vähentää samanaikaisesti otettujen lääkkeiden.

imeytymistä. Ole siis yhteydessä lääkärin ennen **Acidduo**-taipaisen valmisteen alottamista, jos käytät lääkkeitä ja etenkin, jos käytät ehhäispillereitä. Tähän valmisteeseen ei liity tunnettuja vasta-aiheita samanaikaiselle ometropsali-, simetidini- tai sisapsidrilidehytselle. Näissä tapauksissa suositellaan keskustelemaan käytöstä lääkärin kanssa.**6. Säilytys****Acidduo** kuivassa paikassa, suojassa suoritulta lämmönkestäällä ja valolta.

Älä käytä tätä valmista, jos pakkas on vaurioitunut.

Säilytä valmisteelle 25°C:sä.

**7. Varoitus ja varoitusmerkki**

Tämä valmiste on pääosin tarjoiltu yli 18-vuotiaille aikuisille, ja ennen valmisteen käyttöä on suositeltavaa keskustella hoitosta apteekkienilkkoonan tai lääkärin kanssa. Valmisteesta voi myös tilpästi antaa lapsille ja teini-ikäisille huomioilta, ettei annoksen 6–12-vuotiaalle lapsille pitää olla puolet alkuisesta annoksesta ja että käytön tulee tapahtua terveydenhuollon ammatillisien antamien ohjeiden mukaan.

**Raskauden ja imetyksen alkana suostellaan keskustelemaan lääkärin kanssa ennen mahdolista käytöltä.**

Suositellaan annostusta ei saa ylittää, sillä liian isot annokset voivat aiheuttaa ummetusta tai ohuneenväriä ripulia. Valmisteesta saa käyttää kroonisun ummetukseen tai riupilin, muunsaaraidun ja kroonisun sydämen vajatoiminnan yhteydessä.

Älä käytä **Acidduo**-valmisteita yli 20 peräkkäisenä päivän ajan. Jos olet käytävän, käänny lääkärin puoleen. Tabletti on käytettävä kerralla ja se on ottavaa pakauksestaan vasta käytöhetkellä. Älä käytä tätä valmista, jos huomaat siedettävyyssongelmaa. Älä ota valmista, jos tiedät olevasi yliherkkä jollekin valmisteen sisältämälle ainesosalle.**8. Koestaika**

Älä käytä tätä valmista pakauksessa manitun viimeisen käytötpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käytötpäivämäärä koskee ehhjässä pakauksessa säilytettävä tuotetta.

**9. Hävittäminen**

Vanhempiin valmisteeseen on hävittetävä paikallisten jätesäätöiden mukaisesti. Älä missään tapauksessa heitä valmisteita tai sen pakkausta luontoon.

**Tarkistettu viimeksi: 05/2024****AcidDuo**  
Tuggabletter  
**MEDICINTEKNIK PRODUKT, CE0426****DÄMPAR HALSBRÄNNÄ OCH SURA UPPSTÖTTNINGAR LINDRAR FÖR MYCKET MAGSYRA SKYDDAR MAGSLIMHINNAN****1. Produkt, sammansättning och användningsändamål****Acidduo** används för att motverka sura uppstötningar och halsbränna.**Acidduo** gör det möjligt att kontrollera för mycket magra i magssäcken, förhindrar halsbränna, magont och matstöttningsbesvär.**Acidduo** är effektivt oberoende av vad besvären beror på och kan också användas som stödehandling vid gastrit (en inflammation i magssäckens slémminha, s.k. magkatarr).

De rekommenderade doseraderna är 2 tuggtablett efter varje huviudmåltid.

Barn (6–12 år): rekommenderad dos är 1 tuggtablett efter varje huviudmåltid.

Ovan nämnda doser ger en effektiv lindring av besvär, orsakade av för mycket magra, och de förhindrar också reflux av maginnehåll till matstrupen.

De rekommenderade doseraderna får inte överskridas.

**4. Biverkningar**Ingredienserna i **Acidduo** har inte specifica tester visats vara säkra, helt biokompatibla och vältolererade.

Vid rekommenderade doser är de enda rapporterade, möjliga förekommande biverkningarna förstoppling och övergående diare.

Kontakta läkare om symptomet fortsetter.

**5. Interaktioner med kosttilskott och läkemedel**Ingredienserna i **Acidduo** har inga kända interaktioner (samverkan) med kosttilskott (såsom vitaminer, näringssupplärt, örtärpatrer eller homeopatiske produkter) ska tas sen ur vissa typar av halsvärar.

När denna fiber kommer i kontakt med magssäckens sura miljö, bildar den snabbi en vinskös och lätt gel, som täcker och skyddar magslimhinnan.

Den speciella sammansättningen innehåller natriumalginat, alginihappo ja bikarbonaatti.

Även om **Acidduo** inte innehåller alkalisatorer, kan den ändå förtömma sig från vissa typer av halsvärar.

De koldioxidbubblor som bildas i samband med reaktionen fängas in i alginatgelet, vilket omvandlar gelen till ett skum som sedan flyter upp överan maginnehåll.

**1.2 Sammansättning**

Varje tabletten innehåller 200 mg natriumalginat, 50 mg alginysra, 80 mg natriumbikarbonat och 140 mg kalciumpotat.

**Hälspämmen**

Mannitol, suoraulosi, kiseldioxid, växthärsat magneesiumstearat, glycerolilidebenhat, smäkmen: extrakt av ingefära, etersisk ingefärsolja, citron, mint.

**2. Förpackning**

En förpackning innehåller 24 eller 36 tabletter.

**3. Dosering och administreringsätt**

Innan användning till barn rekommenderas att tala med läkare. För valfria och försiktighetsåtgärder, se avsnitt 7 i denna hälsövär.

Vuxna (från 12 år): rekommenderad dos är 2 tuggtablett efter varje huviudmåltid.

Barn (6–12 år): rekommenderad dos är 1 tuggtablett efter varje huviudmåltid.

Ovan nämnda doser ger en effektiv lindring av besvär, orsakade av för mycket magra, och de förhindrar också reflux av maginnehåll till matstrupen.

De rekommenderade doseraderna får inte överskridas.

**4. Biverkningar**Ingredienserna i **Acidduo** har inte specifica tester visats vara säkra, helt biokompatibla och vältolererade.

Vid rekommenderade doser är de enda rapporterade, möjliga förekommande biverkningarna förstoppling och övergående diare.

Kontakta läkare om symptomet fortsetter.

**5. Interaktioner med kosttilskott och läkemedel**Ingredienserna i **Acidduo** har inga kända interaktioner (samverkan) med kosttilskott (såsom vitaminer, näringssupplärt, örtärpatrer eller homeopatiske produkter) ska tas sen ur vissa typar av halsvärar.Även om **Acidduo**-valmisteet inte innehåller alkalisatorer, kan den ändå förtömma sig från vissa typer av halsvärar.

Datumen är förvaltad som förfallodatumet för produktet.

Använd inte detta preparat efter det "används före"-datumet.

Använd inte detta preparat efter det "används före"-datumet.

Använd inte detta preparat om du observerar toleransproblem.

Ta bort produkten om du observerar toleransproblem.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.

Använd inte detta preparat om du observerar övergående diare.